

قلب شکسته یا حمله قلبی

در بسیاری از موارد سندروم قلب شکسته با حمله قلبی اشتباہ گرفته می‌شود. علائم هردو شبیه به هم است. افراد مبتلا به این اختلال از تنگی نفس، سفتی در قفسه سینه، گاهی تعریق، تهوع و استفراغ رنج می‌برند اما هیچ انقباضی در عضلات قلب دیده نمی‌شود. تنها آریتمی ناشی از اضطراب و تپش قلب در عملکرد قلب و در آزمایشات از جمله سونوگرافی عضلات قلب دیده می‌شود. در سندروم قلب شکسته هیچ شریانی مسدود نمی‌شود، حال این که در حمله قلبی شریان‌ها مسدود می‌شوند. به اضافه این که حمله قلبی ممکن است کشنده باشد اما این سندروم در درصد بالایی به مرگ منجر نمی‌شود. حدود ۲۳ درصد از افراد مبتلا به سندروم قلب شکسته از آریتمی قلبی، آمبولی ریوی یا شوک قلبی رنج می‌برند هرچند که این موارد ابتلا اگر به صورت ناگهانی یا شدید ظاهر شود، می‌تواند کشنده باشد. برای تشخیص درست عارضه سندروم قلب شکسته عموماً آزمایش‌های ارجمله تعیین سطح هورمون‌های استرس آدرنالین، نورادرنالین و کورتیزول انجام می‌شود. در صورتی که سطوح این هورمون‌ها بالا باشد پزشک متخصص می‌تواند احتمال دهد که فرد به این سندروم مبتلاست. هرچند که متخصصان برای تشخیص قاطع نیاز دارند تا عملکرد قلب را هم بررسی کنند.

دلایل شکستن قلب

بالارفتن هورمون‌ها و استرس می‌تواند دلایلی برای افزایش ابتلا به این سندروم باشد.

استرس: استرس عاطفی بزرگ، رویدادی دردنگ، جدایی، طلاق، مرگ و از دست دادن دوستان و اعصابی خانواده می‌تواند احتمال ابتلا به این سندروم را بیشتر کند. استرس مثبت، برند شدن در مسابقه و شادی هم می‌تواند باعث بروز سندروم قلب شکسته شود. البته استرس مثبت کمتر از استرس منفی به این اتفاق منجر می‌شود.

ژنتیک: همه ممکن است در طول زندگی در موقعیت استرس‌زاور داشته باشند اما همه به سندروم قلب شکسته مبتلا نمی‌شوند. تحقیقات نشان می‌دهد خیلی وقت‌ها نفرات اعصابی یک خانواده از این بیماری رنج می‌برند. همین تحقیق می‌تواند ثابت کند که این سندروم می‌تواند ارث باشد. بررسی ترکیب ژنتیک افراد مبتلا به سندروم قلب شکسته، ناهنجاری‌هایی را در بخش‌های زنی نشان داد؛ ناهنجاری‌های در ایجاد اختلالات دیگر از جمله چاق، سرطان، اختلالات روانی و زن‌های مسؤول در فشار خون و سطوح تیروئید هم نقش دارند. به جز این اما به اثبات رسیده است که این سندروم می‌تواند با خطر ابتلا به بیماری‌های دیگر هم مرتبط باشد.

درمان

اگر فردی با علائم اولیه سندروم قلب شکسته مواجه شد باید به پزشک مراجعه کند. برای تشخیص اولیه نوار قلبی و آزمایشات انجام می‌گیرد و بعد پزشک می‌تواند درمان را شروع کند. درمان کار迪ومیوپاتی استرسی یکی از روش‌های درمانی است. هدف از این روش درمانی آرام کردن بیمار است. به این صورت که با داروهای مسدودکننده که سطح هورمون‌ها را تنظیم می‌کنند یا با تجویز داروهای تنظیم فشار خون بیمار آرام می‌شود و استرسی کاهش بیدا می‌کند. در برخی موارد در صورتی که شرایط بیمار حاد است، ممکن است در بیمارستان بستری شود. پس از گذشت مدت زمانی، عموماً پس از سه ماه قلب شکسته بهبود پیدا می‌کند. بهبودی مقطعي اما به معنای بهبود کامل و ابتلای نشدن دوباره به این سندروم نیست. در معرض استرس و اضطراب قرار گرفتن می‌تواند دوباره به ابتلای سندروم قلب شکسته منجر شود بنابراین فردی که به سندروم قلب شکسته مبتلاست باید تحت نظر پزشک باشد و در صورتی که دوباره استرس و اضطراب سراغش آمد، برای معالجه به پزشک مراجعه کند.

شیوع ویروس کرونا باعث افزایش آمار سندروم قلب شکسته شده است

کرونا یی که دل هارا شکست



اصطلاح «قلب شکسته» عموماً برای ناراحتی‌ها و غم‌ها استفاده می‌شود و تصویر این است که قلبی واقع‌انمی شکند اماسال هاست که ثابت شده است شکستن قلب به وقوع می‌پیوندد. این روزها افراد بسیاری به دلیل شیوع ویروس کرونا در جهان دچار «سندروم قلب شکسته» می‌شوند. سندروم قلب شکسته به ندرت به مرگ منجر نمی‌شود اما همین سندروم می‌تواند مشکلات قلبی را فرازیش دهد و البته بر عملکرد قلب هم تاثیر منفی بگذارد. سندروم قلب شکسته را علم تاییدی می‌کند و دکتر رضا صابری، متخصص قلب و عروق اطلاعات جامعی در این باره به مامی دهد.

سندرومی برای قلب

در دهه ۱۹۹۰ بود که پژوهشگران ژاپنی بیماری سندروم قلب شکسته را شناسایی کردند. آنها در بررسی‌های زیادی که انجام دادند متوجه شدند استرس ناشی از غم و اندوه می‌تواند به قلب آسیب بزند. سندروم قلب شکسته در واقع در عملکرد قلب و عملکرد بطن چپ اختلال ایجاد می‌کند. سندروم قلب شکسته یا کارديوميوباتی استرس با سندروم تاکوسوبو با استرس درد شدیدی در قلب ایجاد می‌کند و جز بیماری‌های اکتسابی عضله قلب طبقه‌بندی می‌شود. متخصصان قلب معتقدند که یک تا ۲۰ درصد از افرادی که علائم شدند از سندروم قلب شکسته هم رنج می‌برند.

علائم بیماری

اغلب افرادی که به اختلال قلب شکسته مبتلا می‌شوند ممکن است گویند که احساس می‌کنند خون به قلب نمی‌رسد و قلب می‌خواهد از قفسه سینه به بیرون بیاید. آنها در بسیاری از موارد دچار تنگی نفس می‌شوند و بعد از بررسی‌های متواتی دیده می‌شود شریان‌های قلبی سطح استروژن خون کاهش پیدامی کند. در این تحقیقات آنها در بسیاری از موارد دچار تنگی نفس می‌شوند و بعد از بررسی‌های متواتی دیده می‌شود شریان‌های قلبی سالم‌اند اما این اضطراب است که باعث تنگی نفس، تپش قلب و حتی پمپاژ کند خون در قلب می‌شود.

قلب شکسته بانوان

افزایش ابتلا به سندروم قلب شکسته در بانوان بیشتر است و البته دلیل علمی دارد. تحقیقات پژوهشگران نشان می‌دهد کاهش سطح استروژن می‌تواند در افزایش سندروم قلب شکسته مؤثر باشد و هورمون‌های جنسی زنانه اثر محافظتی بر قلب دارد. حال این که بسیاری از بیماری‌های استروژن خون کاهش پیدامی کند. در این تحقیقات آمده است تقریباً ۶۶٪ درصد از زنان مبتلا به این سندروم به طور متوسط در سالگی و یائسگی قرار دارند. به جز این اما هورمون‌های ناشی از اضطراب شدید عاطفی می‌تواند بر افزایش ابتلای تأثیرگذار باشد. در مجموع هم تعداد ابتلای بین بانوان ۵۰ تا ۸۰ سال بیشتر است.

سندروم کرونا

هم ویروس کرونا و هم استرس ناشی از این بیماری مشکلات روحی و روانی فراوانی برای مردم به وجود آورده، یکی از این مشکلات افزایش ابتلا به عارضه قلب شکسته است. آن طور که روان‌شناسان می‌گویند حدود صد درصد از شهروندان در دو سال گذشته اضطراب و استرس را تجربه کرده‌اند. دلیلی که می‌تواند شرایط کارکردن قلب را تهدید کند و البته ابتلا به این سندروم را هم افزایش دهد.